

Wysięgowe zapalenie



Wysięgowe zapalenie ucha środkowego to stan, w którym płyn gromadzi się w błonie bębenkowej. **Zaburza on przewodzenie dźwięków, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia się słuchu u dziecka.**


Utrzymujące się powyżej 3 miesięcy, staje się wysięgowym zapaleniem ucha o charakterze przewlekłym. Ten stan zapalny jest najczęstszą przyczyną niedosłuchu u dzieci, co niekorzystnie wpływa na rozwój mowy oraz zdolności komunikacyjnych. U 70% dzieci, zapalenie utrzymuje się powyżej roku.

W przeciwieństwie do ostrego zapalenie ucha środkowego, wysięgowe zapalenie **nie daje silnych objawów**, jak ból czy gorączka.

Tabela. Porównanie objawów wysięgowego zapalenia ucha środkowego i ostrego zapalenie ucha środkowego

Źródło: Opracowanie własne

| Wysięgowe zapalenie ucha środkowego | Ostre zapalenie ucha środkowego |
|---|---|
| Brak perforacji (pęknięcia) błony bębenkowej | Ból ucha (zwykle pojawia się w nocy i trwa 1-2 dni) |
| Brak objawów ostrego zapalenia ucha środkowego | Uczucie pełności w uchu |
| Często towarzyszy infekcjom górnych dróg oddechowych | Gorączka / wymioty / biegunka |
| Niekorzystny wpływ na rozwój mowy, zdolności językowe i poznawcze | Wyciek z ucha, niedosłuch |



Renata Owińska - logopeda